

Patientengruppen	A	B	C	D
<b>BMI</b>	Über der 90. Perzentile	Über der 90. Perzentile oder über der 97. Perzentile	Über der 97. Perzentile oder über der 99,5. Perzentile	Über der 97. Perzentile oder über der 99,5. Perzentile
<b>Familiäre Situation</b>	Stabil	Eher stabil	Eher instabil, schwierig	Sehr schwierig, instabil
<b>Psychosoziale Problematik</b>	Keine	Vorhanden	Häufig	Vorhanden, psychische Auffälligkeiten (Kind)
<b>Komorbidität der Adipositas</b>	Keine	Selten	Häufig	Vorhanden
<b>Leidensdruck</b>	Vorhanden, adäquat	Hoch	Niedrig	Niedrig oder hoch
<b>Veränderungsmotivation</b>	Hoch	Vorhanden	Gering	Gering, Resignation
<b>Zielplanung</b>	Realistisch	Unrealistisch	Unrealistisch	Unrealistisch
<b>Lebensstil</b>	Aktiv	Eher inaktiv	Inaktiv	Inaktiv, Resignation
<b>Behandlungsnetzwerk</b>	Kinder- und Jugendarzt, Adipositasgruppe (ambulante/stationäre Rehabilitation), Adipositassportgruppe	Kinder- und Jugendarzt, Adipositasgruppe (Vorbereitung ambulant, später ggf. stationäre Rehabilitation), psychosoziale Beratung, z. B. Erziehungsberatung, Adipositassportgruppe	Überwachung (Kinder- und Jugendarzt), Therapie der Komorbidität, Motivationsförderung (Kinder- und Jugendarzt, ambulantes Zentrum)	Kinder- und Jugendarzt, ambulantes Zentrum, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychotherapie, Langzeitmaßnahmen (Reha), Unterstützung durch Jugendamt

